



CELLUVISC® 10 mg/ml
collirio, soluzione, in
contenitore monodose
carmellosa sodica

**Legga attentamente questo foglio prima
di usare questo medicinale perché
contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come
esattamente descritto in questo foglio o
come il medico o il farmacista le ha detto di
fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è CELLUVISC e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CELLUVISC
3. Come usare CELLUVISC
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CELLUVISC
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è CELLUVISC e a cosa serve

CELLUVISC contiene carmellosa sodica, una sostanza appartenente ad un gruppo di farmaci chiamati lacrime artificiali.

CELLUVISC è un emetante e lubrificante per uso oftalmico.

È utile nelle secchezze oculari dovute ad alterazioni della stabilità del film lacrimale.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare CELLUVISC

Non usi CELLUVISC

Se è allergico (ipersensibile) alla carmellosa sodica o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CELLUVISC.

- Prima di ogni applicazione, rimuovere le lenti a contatto e riapplicarle nuovamente dopo 15 minuti.
 - Per evitare contaminazioni o possibili lesioni agli occhi, non lasciare che l'estremità aperta del contenitore monodose tocchi gli occhi o qualsiasi altra cosa.
 - Se si verificano irritazione, dolore, arrossamento o alterazioni della vista o se ritiene che le sue condizioni stiano peggiorando, interrompa l'assunzione di questo medicinale e consulti il medico o il farmacista. È opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.
- Il prodotto, una volta aperto, non deve essere riutilizzato.

Bambini e adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di CELLUVISC nei bambini e negli adolescenti non è stata stabilita.

Altri medicinali e CELLUVISC

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe

usare qualsiasi altro medicinale, incluso altri medicinali senza prescrizione medica. Non sono state osservate interazioni con altri medicinali.

CELLUVISC può prolungare il tempo di contatto di medicinali ad uso locale comunemente usati in oftalmologia. In caso di trattamento concomitante con altre medicazioni oculari, deve aspettare 15 minuti prima di applicare CELLUVISC.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

CELLUVISC può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

CELLUVISC può causare un offuscamento temporaneo della vista. Se si verifica un temporaneo offuscamento, non guidi o utilizzi macchinari finché la vista non è chiara.

3. Come usare CELLUVISC

CELLUVISC è per uso oculare (applicato nell'occhio).

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. La dose raccomandata è 1-2 gocce di prodotto applicate direttamente nel sacco congiuntivale.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Si assicuri che il flaconcino sia intatto prima dell'uso e non presenti cambi di colore od opacità.

Lavi le mani prima dell'uso.



1. Strappi un contenitore monodose dalla striscia.

2. Tenga il contenitore monodose in posizione verticale (con la parte superiore rivolta verso l'alto) e ruoti il tappo.

3. Abbassi delicatamente la palpebra inferiore così da formare una tasca. Capovolgia il contenitore monodose ed eserciti una leggera pressione per far fuoriuscire una goccia di collirio in ciascun occhio.

Getti il contenitore monodose subito dopo l'uso anche se è rimasta della soluzione all'interno.

Se usa più CELLUVISC di quanto deve

Eventuali sovradosaggi non determinano alcun rischio. Se è preoccupato, si rivolga al medico o al farmacista.

Se dimentica di usare CELLUVISC

Applicare la dose successiva come richiesto o al tempo normale come consigliato dal medico o dal farmacista. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con CELLUVISC

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati si possono manifestare con CELLUVISC:

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- irritazione oculare incluso bruciore
- disagio.

Dati Post-Marketing (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Sono stati riportati i seguenti effetti indesiderati da quando CELLUVISC è commercializzato:

- reazioni allergiche (incluso gonfiore oculare o palpebrale)
- occhi appiccicosi
- dolore oculare
- prurito oculare
- croste e/o residuo di medicinale sulla palpebra
- sensazione di avere qualcosa di estraneo negli occhi
- arrossamento dell'occhio/palpebra
- appannamento della visione e/o peggioramento della vista
- aumentata lacrimazione dell'occhio
- lesione della superficie dell'occhio dovuta alla punta del flaconcino che tocca l'occhio durante l'uso

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CELLUVISC

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce e dall'umidità.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul flaconcino monodose, sulla bustina e sulla scatola, dopo Scad..

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Tenere i flaconcini monodose nella bustina e riporre la bustina nella scatola per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Non usi questo medicinale se la confezione mostra segni di manomissione. Non usi questo medicinale se la soluzione cambia colore o diventa torbida.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CELLUVISC

- Il principio attivo è carmellosa sodica 10 mg/ml

- Gli altri componenti sono sodio cloruro, sodio lattato, potassio cloruro, calcio cloruro, acqua purificata

Descrizione dell'aspetto di CELLUVISC e contenuto della confezione

CELLUVISC è un collirio in soluzione viscosa incolore o leggermente gialla, limpida.

Il contenuto della confezione è di 30 flaconcini monodose da 0,4 ml ciascuno forniti in 3 bustine, ciascuna contenente 2 strip da 5 flaconcini monodose.

Titolare dell'A.I.C. in Francia

ABBVIE
10, Rue D'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Francia

Produttore

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Irlanda

Importatore parallelo in Italia

Medifarm S.r.l.
Via Tiburtina 1166/1168
00156 Roma

Riconfezionato da

Difarmed SLU
C/Laurea Miró 379-383
nave 3 Pl El Pla, Sant Feliu de Llobregat
08980 Barcelona
Spagna

Celluvisc® è un marchio registrato di proprietà di Allergan Inc.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 07/2025

PIL-CEC-041672015-A